

ABACITRIC

ABACITRIC es un insecticida/acaricida que controla los estadios móviles de las plagas que se indica en el cuadro de recomendaciones. también se caracteriza por su actividad translaminar, penetrando el tejido de las hojas y formando un depósito del i.a. dentro de las hojas tratadas, proporcionando actividad residual debido a la ingestión del ingrediente activo (actividad de contacto y estomacal), por lo tanto ABACITRIC puede ser utilizado para tratamientos preventivos y/o curativos.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

ABACITRIC inhibe el ácido gamma-aminobutírico (GABA) –un neurotransmisor-, por lo que, ABACITRIC estimula la liberación de GABA a partir de las membranas inhibitoras presinápticas y mejora la fijación de GABA a los receptores en las células musculares de los artrópodos susceptibles. El resultado es un mayor flujo de los iones de cloruro al interior de la célula, bloqueando las señales nerviosas, por lo tanto las plagas se paralizan irreversiblemente, hasta morir. Pertenecen al grupo químico de las Avermectinas (IRAC=6).

RECOMENDACIONES DE USO

Método para preparar y aplicar el producto: Dilúyase el insecticida en la cantidad suficiente de agua para asperjar perfectamente las plantas.

Aplicarse en forma de aspersión usando cualquier tipo de equipo terrestre que asegure un buen cubrimiento del follaje en los cultivos de aguacatero, algodónero, apio, cucurbitáceas, chile, fresa, jitomate, manzano, peral, clavel, gerbera, crisantemo y rosál.

Llene el tanque de aplicación hasta 1/2 de su capacidad, agréguese el producto y complete el volumen. Mantenga en constante agitación.

Aplicarse en forma de aspersión usando cualquier tipo de equipo terrestre o aéreo en los cítricos que asegure un buen cubrimiento de las áreas infestadas.

En aplicaciones terrestres se utilizan de 200 a 400 l/ha de agua, dependiendo del equipo, la intensidad de la infestación y el tamaño de planta. Use las dosis altas para infestaciones de plaga elevadas.

USO AGRICOLA

AgroIQC

ABACITRIC



ABAMECTINA

Insecticida y Acaricida Agrícola/
Concentrado Emulsionable

Garantías de Composición

Ingrediente Activo: ABAMECTINA (Mezcla de Avermectinas B1, conteniendo 90.3% de

Avermectina B1a y 1.8% de Avermectina B1b)

Composición: 1.8 % por ciento en peso (Equivalente a 18.0 gramos de i.a. /l)

Presentación: Concentrado Emulsionable.

Tipo de Plaguicida: Insecticida y acaricida agrícola

Categoría Toxicológica: 4

Registro: RSCO-INAC-0174-360-009-002.



Araña ciclamina


Contraindicaciones: Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana. No se aplique en horas de calor intenso o temperaturas superiores a 35°C, ni cuando el viento sea mayor a 15 km/hora. No aplique si amenaza lluvia o ésta se presenta, porque puede lavar el producto depositado sobre la superficie del follaje del cultivo. No mezcle ni aplique este producto en contra del viento, No se aplique en cultivos para los cuales no esta autorizado su uso.

Fitotoxicidad: Este producto no es fitotóxico a los cultivos y dosis si es aplicado según instrucciones de esta etiqueta.

Incompatibilidad: No mezclarse con CAPTAN ni con productos de fuerte reacción alcalina. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en cada uno de los cultivos de esta etiqueta.

Para el control de la plaga que a continuacion se indica:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS
Limonero1 Lima1 Mandarino1 Naranja1 Toronjo1 (7) 	ARAÑA ROJA Arador o negrilla de los cítricos Ácaro blanco	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Phyllocoptruta oleivora</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	20 – 60 ml/ 100 l agua
Aguacatero1 (28) 	Ácaro café	<i>Oligonychus punicae</i>	0.5-1.0 l/ha
Algodonero1 (20) 	Araña roja Minador de la hoja	<i>Tetranychus cinnabarinus</i> <i>Liriomyza spp.</i>	0.5-1.2 l/ha
Apio1 (3) 	Araña roja	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	0.3-1.2 l/ha
Chile1 (7) 	Minador de la hoja Acaro blanco	<i>Liriomyza spp.</i> <i>Poliphagotarsonemus latus</i>	0.75-1.0 l/ha

CULTIVO	PLAGA		DOSIS
Calabacita² Melón² Pepino² Sandía² Chayote² (3) 	Minador de la hoja	<i>Liriomyza spp.</i>	0.5 l/ha
Fresa¹ (3) 	Araña roja Araña ciclamina	<i>Tetranychus cinnabarinus</i> <i>Steneotarsonemus pallidus</i>	100 ml/ 100 l agua
Jitomate¹ (3) 	Araña roja Gusano alfiler Minador de hoja	<i>Tetranychus spp.</i> <i>Keiferia lycopersicella</i> <i>Liriomyza spp.</i>	100 ml/ 100 l agua
Manzano¹ Peral¹ (28) 	Araña roja	<i>Tetranychus spp.</i>	0.5-1.0 l/ha
Ornamentales Clavel¹ Crisantemo¹ Gerbera¹ Rosal¹ Sin límite 	Araña roja Minador de la hoja	<i>Tetranychus cinnabarinus</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Liriomyza spp.</i>	50-100 ml / 100 l de agua

() Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Observaciones:

1 Aplicación a intervalos de 7 días

2 Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días

TIEMPO DE REENTRADA: 24 horas después de la aplicación