

BENOMYL 50

BENOMYL 50 es un fungicida con acción sistémica y de contacto, que se aplica en aspersión para la prevención y control de enfermedades fungosas. Se puede aplicar en sistema de invernadero, almácigos y plantaciones comerciales de cultivos hortícolas, industriales, ornamentales y gramíneas.

Acción. Es sistémico lo cual permite que se absorba por la hojas, tallos y raíces. Penetra y se mueve dentro del sitio de infección y detiene el proceso infectivo con efecto curativo, su penetración es mayor en plantas herbáceas suculentas que en los tejidos leñosos con cutícula delgada. La absorción radicular es muy eficiente. El momento de la aplicación. Puede ser de forma preventiva o bien cuando aparecen los primeros síntomas de la infección. Puede mezclarse con otros productos preventivos o curativos.

RECOMENDACIONES DE USO

El control de antracnosis solo es eficiente cuando se presenta en hojas en el cultivo de mango. Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 24 h después de la aplicación.

Metodo para preparar y aplicar el producto: En una cubeta con agua vierta el producto necesario para la aplicación y agítelo hasta obtener una mezcla uniforme. Agregue la mezcla lentamente sin dejar de agitar al tanque de aplicación y/o tambo de 200 litros que contenga agua hasta la mitad. Sin dejar de agitar, agregue el agua necesaria para la aplicación cuidando obtener una mezcla uniforme y sin grumos. En cada ocasión que cargue la aspersora, deberá agitar antes la mezcla.

Incompatibilidad: BENOMYL 50 puede ser mezclado con otros plaguicidas registrados en los cultivos indicados, excepto con productos de fuerte reacción alcalina ni aceites. La mezcla con otros productos deberá hacerse con aquellos que se encuentren registrados y autorizados en los cultivos aquí recomendados.

Fitotoxicidad: BENOMYL 50 no es fitotóxico a las dosis y cultivos aquí indicados.

Contraindicaciones: BENOMYL 50 no debe ser aplicado cuando amenace a lluvia o esté lloviendo, ya que puede existir lavado del producto.

USO AGRICOLA

AgroIQC

BENOMYL 50



BENOMILO

Fungicida Agrícola/ Polvo Humectable

Garantías de Composición

Ingrediente Activo: Benomilo

Composición: Benomilo al 50%

Presentación: Polvo humectable

Tipo de Plaguicida: Fungicida Agrícola - Sistémico

Categoría Toxicológica: 4

Registro: RSCO-FUNG- 0303-312-002-050



CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	IS	LMR
AGUACATERO 	ANTRACNOSIS FUMAGINA MANCHA FOLIAR ROÑA O SARNA DEL FRUTO	<i>(Colletotrichum gloeosporioides)</i> <i>(Capnodium spp.)</i> <i>(Cercospora purpurea)</i> <i>(Sphaceloma perseae)</i>	40-60 g/100 l agua	30	3.0
ALMENDRO 	ANTRACNOSIS	<i>(Colletotrichum gloeosporioides)</i>	40-60 g/100 l agua	SL	1.0
APIO 	DAMPING-OFF, P. RADICAL MANCHA FOLIAR MARCHITEZ PUDRICION DEL TALLO Y RAIZ	<i>(Rhizoctonia solani)</i> <i>(Cercospora apii)</i> <i>(Fusarium oxysporum)</i> <i>(Sclerotinia spp.)</i>	300-600 g/ha	7	3.0
ARROZ 	QUEMA DEL ARROZ MANCHADO DE LAS GLUMAS	<i>(Piricularia oryzae)</i> <i>(Cercospora oryzae)</i>	300-500 g/ha	SL	20.0
BULBOS DE ORNAMENTALES 	PUDRICION RADICAL	<i>(Fusarium spp.)</i>	100 g/100 l agua	SL	Exento
CALABACITA  MELON  PEPINO  SANDIA 	ANTRACNOSIS CENICILLA MOHO GRIS PODREDUMBRE GOMOSA PUDRICION RADICAL PUDRICION DEL TALLO Y RAIZ	<i>(Colletotrichum lagenarium)</i> <i>(Erysiphe cichoracearum)</i> <i>(Botrytis cinerea)</i> <i>(Mycosphaerella citrulina)</i> <i>(Verticillium spp.)</i> <i>(Sclerotinia spp.)</i>	300-500 g/ha	7	1.0

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	IS	LMR
FRESA 	CENICILLA MOHO GRIS QUEMADURA DE LA HOJA	<i>(Sphaerotheca macularis)</i> <i>(Botrytis cinerea)</i> <i>(Diplocarpon earliana)</i>	400-600 g/ha	SL	5.0
FRIJOL 	ANTRACNOSIS TIZON DE LA VAINA Y TALLO	<i>(Colletotrichum lindemuthianum)</i> <i>(Diaporthe phaseolorum)</i>	300-500 g/ha	14	2.0
JITOMATE 	ANTRACNOSIS MANCHA FOLIAR MARCHITEZ SUREÑA MOHO GRIS	<i>(Colletotrichum phomoides)</i> <i>(Septoria lycopersici)</i> <i>(Sclerotium rolfsii)</i> <i>(Cladosporium fulvum)</i>	400-600 g/ha	1	50.0
LIMONERO  MANDARINO  NARANJO  TORONJO 	ANTRACNOSIS CENICILLA FUMAGINA MELANOSIS	<i>(Colletotrichum gloeosporioides)</i> <i>(Oidium tingitaninum)</i> <i>(Capnodium citri)</i> <i>(Diaporthe citri)</i>	60-90 g/100 l agua	1	10.0
MANGO 	ANTRACNOSIS FUMAGINA ROÑA DEL FRUTO	<i>(Colletotrichum gloeosporioides)</i> <i>(Capnodium spp.)</i> <i>(Elsinoe mangiferae)</i>	60-80 g/100 l agua	14	3.0
MANZANA 	CENICILLA FUMAGINA PUDRICION AMARGA DEL FRUTO ROÑA O SARNA	<i>(Podosphaera leucotricha)</i> <i>(Capnodium spp.)</i> <i>(Glomerella cingulata)</i> <i>(Venturia inaequalis)</i>	40-60 g/100 l agua	SL	7.0

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	IS	LMR
PERAL 	FUMAGINA PUDRICION AMARGA ROÑA O SARNA	(<i>Capnodium spp.</i>) (<i>Glomerella cingulata</i>) (<i>Venturia pirina</i>)	40-60 g/100 l agua	SL	7.0
PIÑA 	PUDRICION DEL FRUTO PUDRICION DE LA BASE	(<i>Thielaviopsis paradoxa</i>) (<i>Rhizoctonia spp.</i>)	250-500 g/100 l agua	SL	35.0
PLATANO 	PUDRICION DE LA CORONA SIGATOKA AMARILLA SIGATOKA NEGRA	(<i>Penicillium spp.</i>) (<i>Mycosphaerella musicola</i>) (<i>Mycosphaerella fijiensis</i> var. <i>difformis</i>)	50-70 g/100 l agua	7	
SOYA 	ANTRACNOSIS MANCHA FOLIAR MANCHA OJO DE RANA MANCHA PURPURA MARCHITEZ SUREÑA TIZON DE LA VAINA Y TALLO	(<i>Colletotrichum dematium</i>) (<i>Mycosphaerella spp.</i>) (<i>Cercospora sojina</i>) (<i>Cercospora kikuchii</i>) (<i>Sclerotium rolfsii</i>) (<i>Diaporthe phaseolorum</i>)	200-400 g/ha	14	0.2
VID 	CENICILLA MOHO GRIS PUDRICION NEGRA PUDRICION SUAVE	(<i>Uncinula necator</i>) (<i>Botrytis spp.</i>) (<i>Guignardia bidwellii</i>) (<i>Diplodia natalensis</i>)	500-700 g/ha	7	10
	ANTRACNOSIS CENICILLA FUMAGINA MANCHA FOLIAR PUDRICION MORENA	(<i>Colletotrichum spp.</i>) (<i>Sphaerotheca spp.</i>) (<i>Capnodium spp.</i>) (<i>Phyllosticta spp.</i>) (<i>Monilinia fructicola</i>)	40-60 g/100 l agua	SL	15.0



INTERENE 50% PH

INTERENE 50% PH es un fungicida específico para el control de enfermedades fungosas en hortalizas, tabaco y gladiola, sin afectar negativamente el olor o sabor de los frutos. Se aplica en aspersión al follaje y de forma preventiva al desarrollo de la enfermedad o al detectar los primeros síntomas de su presencia.

Es un fungicida muy versátil, eficaz y seguro, cuyas propiedades de humectabilidad y suspensibilidad proporcionan una mayor distribución, adherencia y persistencia sobre el follaje de las plantas.

La finísima capa protectora que forma sobre las superficies tratadas evita la germinación y penetración de hongos fitopatógenos. Su amplia acción de contacto favorece la reducción del inóculo presente, evitando infecciones posteriores y diseminación de la enfermedad.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

Al actuar sobre la coenzima A, de carácter tiólico, interfiere el mecanismo respiratorio interrumpiendo el ciclo de krebs, provocando acumulación de hidratos de carbono y de ácido pirúvico, causando la muerte de las células fungosas.

RECOMENDACIONES DE USO

INTERENE 50% PH es un fungicida líquido preventivo, que debe ser aplicado en aspersión con la suficiente cantidad de agua para lograr un cubrimiento uniforme del cultivo en que se aplique, utilizando equipo terrestre de mochila, montado al tractor o aéreo.

Su versatilidad permite que sea aplicado en aspersión antes o al momento de observar los primeros síntomas de la presencia de la enfermedad y continuarse hasta el mismo día de la cosecha, debido a que está exento de intervalo de seguridad.

La variación de la dosis recomendada depende del desarrollo vegetativo del cultivo y de la severidad de la enfermedad. Aplique la dosis alta a mayor incidencia y cuando las condiciones ambientales favorezcan su desarrollo, repitiendo la aplicación a intervalos de 7 a 10 días.

USO AGRICOLA

AgroIQC

INTERENE 50% PH[®]



ANILAZINA
Fungicida/ Polvo Humectable

Garantías de Composición

Ingrediente Activo: Anilazina (4,6-Dicloro-N-(2clorofenil)-1,3,5-triazin-2-amino)

Composición: 50.00% en peso, equivalente a 500 g de i.a./Kg

Presentación: Polvo Humectable

Tipo de Plaguicida: Fungicida triazínico de contacto

Categoría Toxicológica: 4

Registro: RSCO-FUNG-0301-004-002-050

