

CIMETRIN 200

CIMETRIN 200 es un insecticida piretroide de contacto y estomacal, de acción rápida como insecticida por su efecto de derribo, de baja toxicidad, sumamente versátil, biodegradable, insoluble en agua y no presenta problemas de residuos. Actúa sobre estadios larvarios de lepidópteros y adultos de plagas agrícolas. El efecto de su persistencia es prolongado, así reduce la posibilidad de reinfestación y el posible depósito de huevecillos de los insectos.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

Es absorbido mayormente a través de la cutícula de los insectos ejerciendo su acción como insecticida de contacto, pero es efectivo como veneno gástrico cuando ingresa al tracto alimentario. Las dosis letales ocasiona la muerte del insecto, las sub-letales producen cambios en el comportamiento que reducen la capacidad de causar daño (efecto de repelencia, inhibición de la nutrición y oviposición entre otras).

RECOMENDACIONES DE USO

Método para preparar y aplicar el producto: Diluir en agua y aplicar en forma de aspersión, usando el equipo que asegure el cubrimiento de las áreas infestadas. Se deberá llenar el tanque una cuarta parte de su capacidad, poner a funcionar el sistema de agitación y agregar la cantidad necesaria de CIMETRIN 200. después añada el resto del agua y continúe agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Se recomienda utilizar de 200 a 400 litros de agua por hectárea, previa calibración.

Compatibilidad: Puede mezclarse con otros plaguicidas registrados y autorizados para estos cultivos sin que pierda o reduzca sus propiedades, excepto con productos de fuerte reacción alcalina.

Fitotoxicidad: CIMETRIN 200 no es fitotóxico en las dosis recomendadas en los cultivos indicados.

USO AGRICOLA

AgroIQC

CIMETRIN 200®



CIPERMETRINA

Insecticida y/o Acaricida/ Concentrado Emulsionable

Garantías de Composición

Ingrediente Activo: Cipermetrina ((±)-Alfa-Ciano-3-fenoxibencil(±)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato)).

Composición: 21.05% en peso, equivalente a 200 g de i.a./l

Presentación: Concentrado emulsionable.

Tipo de Plaguicida: Insecticida piretroide de contacto y estomacal.

Categoría Toxicológica: 3

Registro: RSCO-INAC-0111-408-009-021.

Contraindicaciones: No se aplique en días con vientos que arrastren el producto hacia áreas indeseadas.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS l/ha
MAIZ (1) 	GUSANO COGOLLERO (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	300-500

() Intervalo de seguridad en días.

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: 24 h después de la aplicación.