

CONTRAVECTOR

CONTRAVECTOR es un insecticida de acción sistémica y de contacto. Puede usarse en tratamientos al follaje, al suelo y en el sistema de riego mostrando movimiento acropetal (hacia arriba) de esta forma protege los puntos de crecimiento de la planta.

Su mecanismo de acción se basa en la interferencia de la transmisión de los estímulos nerviosos de los insectos. Posee amplio espectro de acción y controla satisfactoriamente plagas que han desarrollado resistencia a otros insecticidas.

RECOMENDACIONES DE USO

Método para preparar y aplicar el producto.- Agite el producto. Llene los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames.

Colocar agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de aspersión e iniciar la agitación, vierta la cantidad recomendada de CONTRAVECTOR y complete la capacidad del tanque con el agua necesaria. Mantener la agitación durante la mezcla y aplicación del producto al cultivo.

La aplicación en drench se debe realizar con un equipo de mochila manual, ya sea quitando la boquilla ó con una lanza a manera de inyector, la cual es dirigida a la base de cada planta en donde se libera de 20 a 30 ml de la mezcla de acuerdo a la calibración realizada. El suelo debe estar en condiciones semihúmedas.

Incompatibilidad: CONTRAVECTOR es compatible con la mayoría de los productos comúnmente utilizados en los cultivos recomendados, con excepción de los de reacción fuertemente alcalina.

Fitotoxicidad: CONTRAVECTOR no es fitotóxico a las dosis y cultivos aquí indicados.

Contraindicaciones: CONTRAVECTOR no debe ser aplicado cuando amenace lluvia o esté lloviendo, ya que puede existir lavado del producto

USO AGRICOLA

AgroIQC

CONTRAVECTOR



IMIDACLOPRID

Insecticida Agrícola/ Suspensión Concentrada

Garantías de Composición

Ingrediente Activo: Imidacloprid (1-(6-cloro-3-piridin-3-ilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamina.)
Composición: 30.20% en peso, equivalente a 3500 g de ingrediente activo/Kg
Presentación: Suspensión concentrada
Tipo de Plaguicida: Insecticida
Categoría Toxicológica: 4
Registro: RSCO-INAC-0199-371-064-030

Mosquita Blanca



Se recomienda su uso en los cultivos abajo descritos y para el control de las plagas que continuación se mencionan:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Calabacita Calabaza Melón Pepino Sandía (21) 	Mosquita blanca <i>(Bemisia tabaci)</i>	0,750 – 1,250 l/ha	Realizar una aplicación en drench 7 días después de la emergencia del cultivo. Volumen de agua: 600 l/ha
Jitomate Berenjena  Chile  Papa (21) 	Mosquita blanca <i>(Bemisia tabaci)</i> Pulgón saltador <i>(Bactericera cockerelli)</i>	Pretransplante: 2 ml/1000 plántulas + Al cuello: 0,75 – 1,25 l/ha	Realizar una aplicación al follaje, diluir 2 ml del producto en el volumen de agua requerido para asperjar las charolas conteniendo 1000 plántulas Una aplicación en drench 2 semanas después del transplante. La dosis de aplicación baja y media tienen un periodo de protección de 3 semanas y la dosis alta de 4 semanas después de la aplicación. Volumen de agua: 25 ml/planta para la aplicación al cuello después del transplante.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 12 horas

() INTERVALO DE SEGURIDAD = Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha