

Ficha Técnica

REGISTRO COFEPRIS: RSCO-FUNG-0329-308-034-084

1. GENERALIDADES

Cupe Red 75 WG, es un fungicida derivado del cobre que se recomienda para la prevención y control de enfermedades fungosas.

2. COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO	% EN PESO
Óxido cuproso: óxido cuproso	84.44 %
“Con un contenido de Cu metálico como elemento no menor de 88.81%” (Equivalente a 750 g. de i.a./ Kg.)	
INGREDIENTES INERTES	
Dispersante, antioxidante, agente de redispersión	15.56 %
Total	100.00 %

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS

Nombre común Óxido Cuproso	Categoría toxicológica 5
Grupo químico Compuestos de Cobre	Fitotoxicidad Este producto no es fitotóxico a los cultivos aquí recomendados si es utilizado de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta.
Nombre químico Óxido Cuproso	Incompatibilidad Cupe Red 75 WP no mezclarlo con agroquímicos de fuerte reacción alcalina, en caso de que requiera mezclarlo con otro producto; realice pruebas a baja escala antes de aplicar las mezclas, con la finalidad de evitar efectos fitotóxicos. Para la realización de mezclas estas deberán hacerse con productos que estén registrados y en cultivos autorizados en esta etiqueta para la combinación cultivo - enfermedad.
Formulación Granulos Dispersables	Contraindicaciones No aplicar ni manejar el Cupe Red 75 WP sin el equipo de protección adecuado.

Ficha Técnica

Concentración 84.44 %	
---------------------------------	--

4. RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE USO

Cultivo	Enfermedad	Dosis Kg/Ha	Observaciones
CAFETO (SL)	OJO DE GALLO <i>Mycena citricolor</i> MAL DE HACHAS <i>Corticium koleroga</i> ROYA <i>Hemileia vastatrix</i>	1.5	Iniciar las aplicaciones al observarse los primeros síntomas de las enfermedades. Aplicar cada siete días pudiendo realizarse hasta tres aplicaciones por ciclo.
AGUACATE (SL)	ANTRACNOSIS <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> ROYA <i>Sphaceloma persea</i>	1.0	Iniciar las aplicaciones al inicio de la maduración de los frutos, cuando se observen los primeros síntomas de las enfermedades. Aplicar cada siete días pudiendo realizarse hasta tres aplicaciones por ciclo
MANZANO (SL)	ROÑA <i>Venturia inaequalis</i>	1.0	Iniciar las aplicaciones en forma preventiva. Realizar tres aplicaciones por ciclo, empezando al inicio de la formación de frutos. Aplicar cada siete días.
NARANJO (SL)	MANCHA GRASIENTA <i>Mycosphaerella citri</i> ANTRACNOSIS O TIZÓN DE LA FLOR <i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	1.0 – 1.3	Iniciar las aplicaciones al observar los primeros síntomas de las enfermedades. Aplicar cada siete días pudiendo hacerse hasta tres aplicaciones por ciclo.
CALABAZA (SL)	MILDIU <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	1.25	Iniciar las aplicaciones una vez detectadas las condiciones óptimas para la enfermedad. Aplicar con un intervalo de siete días pudiendo realizarse hasta cuatro aplicaciones por ciclo.
JITOMATE (SL)	TIZÓN TARDÍO <i>Phytophthora infestans</i>	1.25 – 1.50	Iniciar aplicaciones una vez detectadas las condiciones óptimas para la enfermedad. Aplicar con un intervalo de siete días

Ficha Técnica

			pudiendo realizarse hasta cuatro aplicaciones por ciclo.
PLÁTANO (SL)	SIGATOKA NEGRA <i>Mycosphaerella fijiensis</i>	0.4 – 0.5	Realizar cinco aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días; volumen de aplicación: 1100 – 1200 L de agua / Ha.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 12 horas.

SL= Sin Límite

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Use el equipo de protección adecuado: gorra de algodón o sombrero, googles o lentes de seguridad, mascarilla con respirador guantes y botas de neopreno que sólo se destine para el manejo y aplicación de este producto. Forma de abrir el envase del producto: Realice el corte al sobre o saco con precaución, utilizando guantes y mascarilla de protección contra polvos, evitando el contacto con la piel y ojos. Llene con agua hasta la mitad, el tanque de la aspersora. En un recipiente aparte y en poca agua, diluya. La dosis recomendada de **Cupe Red 75 WG** agitando energéticamente hasta formar una lechada. Agregue esta mezcla al tanque de la aspersora, bajo agitación. Llene finalmente hasta su capacidad total el tanque de la aspersora con agua, agitando. Mantenga la mezcla en agitación durante el tratamiento.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Los aplicadores y personas que manejen el producto deben usar el equipo de protección personal adecuado como camisa de manga larga, pantalones largos, calcetines con zapatos o botas resistentes al agua y a productos químicos. Se recomienda utilizar un overol sobre la ropa, que cubra los guantes y las botas para evitar la infiltración del producto al cuerpo. Los guantes que dan mayor protección en el manejo de productos químicos agrícolas son los de nitrilo, butilo y/o neopreno. Usar googles o mascarilla protectora durante la aplicación, así como, sombrero o gorra de plástico. Durante la preparación y aplicación del producto hágalo a favor del viento, no coma, beba o fume durante el manejo del producto. Al terminar las labores descontamine el equipo de aplicación, quítese el overol y colóquelo en un lugar ventilado, la ropa utilizada durante la aplicación debe lavarse con agua y jabón. Los guantes utilizados deben lavarse antes y después de usarlos. Báñese con abundante agua y jabón y póngase ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE MANIPULANDO ESTE PRODUCTO”

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.”

“MÁNTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.”

“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”

Ficha Técnica

“NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN.”

“NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.”

“NO MANIPULE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.”

“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.”

“AL FINAL DE LA JORADA DE TRABAJO BAÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.”

“NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.”

“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.”

“NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.”

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.”

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.”

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO PALIQUE DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).”

“EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE Y LO DEMÁS, COGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.”

Mayor información:

Nufarm Grupo México S. de R.L. de C.V.
Av. Moctezuma 3515, Local 5 Zona C
Ciudad del Sol, C.P. 45050
Zapopan Jalisco,
Tel: (33) 31 21 41 08

