

REGISTRO COFEPRIS: RSCO-MEZC-1101D-301-064-022

1. GENERALIDADES

Eforia® es un insecticida compuesto de dos ingredientes activos el thiametoxam y lambda-cyhalotrina. Es un producto para el control de las plagas que aquí se indican y que atacan a los cultivos indicados en el cuadro de recomendaciones.

Eforia® actúa de forma sistémica y de contacto al ser absorbido y distribuido por el follaje.

Eforia® debe combinarse otras prácticas agrícolas para reducir al mínimo la densidad poblacional, como: la destrucción de hospederas alternantes, elección apropiada de fechas de siembra, así como la rotación con insecticidas de diferente modo de acción.

2. COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTES ACTIVOS	% EN PESO
Thiametoxam: (EZ)-3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-iliden(nitro)amina (Equivalente a 141 g. de i.a./ L a 20°C)	12.62 %
Lambda-cyhalotrina: (R)-alfa-ciano-3-fenoxibencil-(1S)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato (Equivalente a 106 g. de i.a./ L a 20°C)	9.49%
INGREDIENTES INERTES Surfactante, antiespumante, anticongelante, espesante, conservador, ajustadores de pH, agente dispersante, emulsificante, solvente y diluyente	77.89 %
Total	100.00 %

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS

Nombre común Thiametoxam + Lambda-cyhalotrina	Categoría toxicológica 4
Grupo químico Thiametoxam: Neonicotinoide Lambda-cyhalotrina: Piretroide	Fitotoxicidad Eforia® no es fitotóxico en los cultivos y dosis aquí indicadas si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

Nombre químico Thiametoxam (EZ)-3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-iliden(nitro)amina Lambda-cyhalotrina: (R)-Alfa-Ciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropano carboxilato y (S)- Alfa-ciano-3-fenoxibencil (1R)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3 trifluoropropenil]-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato	Incompatibilidad No haga mezclas de Eforia® , no presenta problemas de incompatibilidad con los insecticidas y fertilizantes foliares registrados y autorizados en estos cultivos. Sin embargo, para asegurarse de la compatibilidad física, se recomienda hacer una premezcla en un recipiente con la dosis completa y dejarlo en reposo 5 minutos. Si no se presenta una precipitación de los materiales, debe considerarse que dicha mezcla es físicamente compatible.
Formulación Suspensión Concentrada	Contraindicaciones No aplique Eforia® en horas de calor intenso. No aplique Eforia® en periodos de baja humedad y temperatura alta ya que la evaporación incrementa la pérdida de producto. No aplique Eforia® con inversión térmica o en días con neblina. No aplique Eforia® con una velocidad del viento superior a 10 Km/Hora.
Concentración Thiametoxam: 12.62% Lambda-cyhalotrina 9.49%	pH 6.4 concentración 1% w/v
Densidad 1.119 g/cm ³ (25°C)	Apariencia Líquido opaco, Beige claro, aromático.

4. RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE USO

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS L/Ha	OBSERVACIONES
Algodonero (14)	Mosquita blanca <i>Bemisia argentifolii</i>	300 - 500	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días; cuando se detecten los primeros adultos. Volumen de aplicación 650 L/Ha.
	Ninfas de mosquita blanca <i>Bemisia tabaci</i> Chinche ligus <i>Lygus lineolaris</i>	200 - 300	
	Gusano Bellotero <i>Heliothis virescens</i>	300 - 500	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 10 días. Aplicación foliar en cobertura total sobre el follaje. Volumen de aplicación 500 L/Ha.
Jitomate	Mosquita blanca <i>Bemisia tabaci</i>	200 - 400	Realice de 2 aspersiones al follaje a intervalos de 7 días. Volumen de aplicación 400-500 L/Ha. Se recomienda usar un adyuvante no iónico en la mezcla.
Chile			
Papa			
Tomate de cáscara	Pulgón saltador	100 - 300	Realice de 3 aspersiones al follaje a intervalos de 7 días.

Ficha Técnica

Berenjena (5)*	<i>Bactericera cockerelli</i>		Volumen de aplicación 400 L/Ha.
Jitomate Chile (5)*	Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i>	0.2 g de Actigard/L de agua	Una aplicación en charola 5 días antes del trasplante, utilizando un volumen aprox. de 30 mL de mezcla/charola, asegurando un buen cubrimiento del follaje.
	Pulgón <i>Myzus persicae</i>	300 a 500 mL de Engeo/Ha + 15 g de Actigard/Ha	Realice 4 aplicaciones en campo, iniciando a los 7 días después del trasplante, en 2 bloques con 2 aplicaciones a intervalos de 7 días cada uno y un periodo sin aplicación de 14 días entre bloques, o sea que el programa de aplicaciones es el siguiente: 7, 14, 28 y 35 días después del trasplante. El volumen de aplicación es de 300 a 400 L de agua por hectárea. El presente programa de aplicaciones ayuda a reducir la expresión de signos de virosis (TYLCV).
Caña de azúcar (14)	Mosca Pinta <i>Prosapia simulans</i>	200 - 300	Realizar 2 aspersiones al follaje a intervalos de 10 días cuando se detecten los primeros adultos; volumen de aplicación 600 L/Ha.
	Escama acanalada <i>Orthezia acapulcoa</i>	150 - 400	Realizar 2 aspersiones al follaje a intervalos de 7 días cuando se detecten los primeros adultos. Volumen de aplicación de 1000L/Ha. Para asegurar un control adecuado deberá agregar a la mezcla un coadyuvante no iónico.
	Pulgón amarillo <i>Sipha flava</i>	100 - 250	Haga la primera aplicación a los primeros indicios de población, si la infestación continua haga otra aplicación a intervalo de 7 días. Use un volumen de agua de 700L/Ha. Se recomienda usar un adyuvante no iónico en la aplicación.
	Gusano barrenador del tallo <i>Diatraea magnifactella</i>	200 - 400	Realizar una aplicación en drench, al cuello de la planta; de ser necesario, realizar una segunda aplicación a intervalo de 7 días; volumen de aplicación 2,000 L de agua por hectárea.
Frijol Soya (14)*	Mosquita blanca <i>Bemisia tabaci</i>	200 - 300	Realizar 3 aplicaciones a intervalos de 7 días cuando se detecten los primeros adultos; volumen de aplicación 500 L/Ha.
Tabaco (SL)	Picudo o tortuguilla <i>Trichobaris championi</i>	200 - 300	Realizar 2 aspersiones al follaje a intervalos de 7 días cuando se detecten los primeros adultos; volumen de aplicación 500 L/Ha.
	Gusano de la yema del tabaco	100 - 300	

Ficha Técnica

	<i>Heliothis virescens</i> Gusano peludo <i>Estigmene acrea</i>		
Calabacita Melón Pepino Sandía Calabaza (5)*	Mosquita blanca <i>Bemisia tabaci</i> Pulgón <i>Aphis gossypii</i>	300 - 500 100 - 300	Realizar 2 aspersiones al follaje a intervalos de 7 días cuando se detecten los primeros adultos.
Trigo Cebada Avena (14)*	Pulgón verde del trigo <i>Schizaphis graminum</i>	75 - 125	Realizar una aplicación al follaje al detectar los primeros adultos.
Aguacatero (14)	Trips <i>Frankliniella occidentalis</i> Chicharrita <i>Idona minuenda</i>	200 - 400	Realizar una aplicación al follaje al detectar los primeros adultos. Se recomienda un volumen de aplicación de 1,000 L/Ha.
Nogal (14)	Pulgón amarillo del Nogal <i>Monellia caryella</i>	400 - 600	Realice 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días al detectar los primeros adultos. Volumen de aplicación 1,000 L/Ha.
Frijol (14)	Conchuela <i>Epilachna varivestis</i> Mosca Blanca <i>Bemisia tabaci</i> Trips <i>Caliothrips phaseoli</i>	75 - 150 200 - 300	Realice 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días al detectar los primeros adultos. Volumen de aplicación 500 L/Ha.
Soya Garbanzo Chícharo Lenteja (14)*	Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i>	75 - 150	Realice 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días al detectar los primeros adultos volumen de aplicación 300 L/Ha. Realice 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 2 días al detectar los primeros adultos. Volumen de aplicación 500 L/Ha.
Limonero Naranja Mandarino Toronjo Pomello Lima (14)*	Psilido Asiático de los cítricos <i>Diaphorina citri</i>	150 - 300	Realizar 2 aspersiones al follaje a intervalos de 14 días cuando se detecten los primeros adultos. Volumen de aplicación de 500 a 600 L de agua. Para asegurar un adecuado control es necesario agregar a la mezcla un coadyuvante no iónico.
Maíz Sorgo (14)*	Trips <i>Frankliniella occidentalis</i>	300 - 400	Realizar la primera aplicación al follaje y cogollo cuando se vean los primeros individuos, si es necesario realice otra aplicación con un intervalo de 7 días. El volumen de agua puede variar de acuerdo al tamaño y desarrollo del cultivo, generalmente el ataque de trips ocurre cuando la planta está muy pequeña. Para esta etapa puede usar de

Ficha Técnica

			250 a 350 L de agua. Procure tener siempre buena cobertura.
Maíz (14)	Mosca de los Estigmas <i>Euxesta stigmatias</i>	200 - 400	Dirija la aspersión al jilote. Use un volumen de agua de 500 a 600 L/Ha.
Guayabo (S/L)	Picudo de la guayaba <i>Conotrachelus dimidiatus</i>	200 - 400	Haga 2 aspersiones al follaje con intervalos de 8 días. Use un volumen de agua de 500 a 600 L/Ha, cuidando de tener una buena cobertura.
Rosal (S/L)	Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i>	400	Realice 2 aspersiones al follaje. Use un volumen de agua de 350 a 450 L/Ha. Se recomienda usar un adyuvante no iónico en la aplicación.
Gerbera (S/L)	Mosca blanca <i>Trialeurodes vaporariorum</i> Pulgón <i>Myzus persicae</i>	200 - 400	Realizar una aplicación al follaje; realizar una segunda aplicación a intervalo de 7 días; volumen de aplicación 1,500 L de agua por hectárea.
Mango (14)	Trips <i>Frankliniella</i> sp.	200 - 400	Realizar 2 aplicaciones al follaje; para asegurar un control adecuado es necesario agregar a la mezcla un coadyuvante no iónico a razón de 0.5 a 100 L de agua; volumen de aplicación 1,000 L de agua por hectárea.
Papayo (7)	Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i>	200 - 400	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días para asegurar un control adecuado es necesario agregar a la mezcla un coadyuvante no iónico a razón de 0.5 a 100 L de agua; volumen de agua 300 a 500 L de agua por hectárea.
Sorgo (30)	Mosca midge <i>Contarinia sorghicola</i>	200 - 400	Realizar una aplicación al follaje; para asegurar un control adecuado es necesario agregar un coadyuvante no iónico; volumen de aplicación 400 a 500 L de agua por hectárea.
Sorgo (14)	Pulgón amarillo (<i>Melanaphis sacchari</i>)	100 a 200	Realizar dos aplicaciones dirigidas al follaje y partes terminales (aplicación total al cultivo), con intervalos de 7-14 días dependiendo del nivel de infestación, al detectar las primeras poblaciones de pulgón amarillo y/o mielecilla en las hojas inferiores de la planta.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas.

() Intervalo de seguridad en días que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

*= Aplica para el grupo botánico, aquí descrito.

(SL)= Sin Límite

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Para abrir el envase de **Eforia®** gire la tapa hasta romper el arillo de plástico, con la misma tapa de forma invertida colóquela sobre el sello de seguridad presionando y girando la tapa para romper totalmente el sello. Ponga la mitad de agua en su tanque de aspersión con la dosis del producto recomendada, mantenga agitación constante, complete el resto de agua. Para obtener óptimos resultados, asegure una buena cobertura en la aplicación del producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Lea cuidadosamente la etiqueta. Los aplicadores y personas que manejan el producto deben usar el equipo de protección personal necesario para realizar con seguridad las actividades de manejo, preparación y aplicación del producto (overoles resistentes a productos químicos sobre una camisa de manga larga y pantalones largos, guantes resistentes a productos químicos, mascarilla con filtro universal -en caso de alta exposición utilice equipo respiratorio con fuente de aire fresco-, lentes industriales o careta, gorra y botas de trabajo).

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”
- “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO

EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.

- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”
- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS MÁS CERCANO.”
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA DE APLICACIÓN”

“CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS). ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

Mayor información:

Nufarm Grupo México S. de R.L. de C.V.
Av. Moctezuma 3515, Local 5 Zona C,
Ciudad del Sol, C.P. 45050
Zapopan, Jalisco
Tel: (33) 31 21 41 08