

# SUPERFLUABLE®

SUPERFLUABLE es un fungicida cúprico preventivo, que se aplica en aspersión al follaje, útil para prevenir algunas enfermedades fungosas que atacan a una amplia gama de cultivos. El oxiclورو de cobre es la segunda forma de empleo del cobre más extendida después del sulfato.

Este producto no requiere neutralización previa debido a que se aplica como tal, no obstruye boquillas y se usa a menor dosis que el caldo bordelés, presentando mayor compatibilidad con los plaguicidas por su alcalinidad.

Esto explica su amplio uso en variadas aplicaciones y su empleo en formulaciones mixtas de fungicidas orgánicos y compuestos cúpricos, como ocurre en las mezclas con ditiocarbamatos y otras presentes en el mercado.

Su pH con tendencias a la neutralidad es importante debido a que no se presente el riesgo de fitotoxicidad ni corrosividad a los equipos de aplicación.

## RECOMENDACIONES DE USO

**Método para preparar y aplicar el producto:** Antes de usar el producto, agite perfectamente el envase con su contenido para asegurar una mezcla uniforme. SUPERFLUABLE se mezcla directamente con la suficiente cantidad de agua para lograr un cubrimiento uniforme de las superficies tratadas. Llene el equipo de aplicación hasta la mitad de su capacidad, vierta la cantidad de SUPERFLUABLE que vaya a aplicar, posteriormente complete con agua y agite vigorosamente hasta obtener una mezcla homogénea.

**Incompatibilidad:** SUPERFLUABLE no debe ser mezclado con productos a base de mercurio ni con aquellos de fuerte reacción alcalina.

**Fitotoxicidad:** SUPERFLUABLE, a las dosis recomendadas no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados.

**Contraindicaciones:** SUPERFLUABLE no debe ser aplicado cuando se prevé lluvia o esté lloviendo, ya que puede existir lavado del producto.

USO AGRICOLA

**AgroIQC**

# SUPERFLUABLE®



OXICLORURO DE COBRE

Fungicida Cúprico/ Suspensión Acuosa

## Garantías de Composición

Ingrediente Activo: Oxiclورو de Cobre  
( $\text{CuCl}_2 \cdot 3\text{Cu}(\text{OH})_2$ ), con un contenido de cobre metálico como elemento no menor de 59.0%  
Composición: 22.73% en peso, equivalente a 282 g de ingrediente activo/litro  
Presentación: Suspensión acuosa  
Tipo de Plaguicida: Fungicida bactericida cúprico  
Categoría Toxicológica: 4  
Registro: RSCO-FUNG-0328-013-008-023

ANTRACNOSIS en Jitomate



| CULTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ENFERMEDAD                                                                      |                                                                                                                                                                        | DOSIS                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>AGUACATERO</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANTRACNOSIS<br>SARNA O ROÑA                                                     | <i>(Colletotrichum gloeosporioides)</i><br><i>(Sphaceloma perseae)</i>                                                                                                 | 300-400 ml/100 l de agua               |
| <b>CEBOLLA</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MANCHA PURPURA<br>MILDIU                                                        | <i>(Alternaria porri)</i><br><i>(Peronospora destructor)</i>                                                                                                           | 2.5-3.0 l/ha                           |
| <b>CITRICOS</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MANCHA GRASIENTA<br>MELANOSIS<br>ROÑA                                           | <i>(Mycosphaerella citri)</i><br><i>(Diaporthe citri)</i><br><i>(Elsinoe fawcetti)</i>                                                                                 | 300-400 ml/100 l de agua<br>5 l/ha máx |
| <b>CUCURBITACEAS:</b><br><b>Calabaza</b><br><br><b>Melón</b><br><br><b>Pepino</b><br><br><b>Sandía</b><br> | ANTRACNOSIS<br>MILDIU<br>MANCHA ANGULAR<br>PUDRICION BACTERIANA<br>TIZON FOLIAR | <i>(Colletotrichum lagenarium)</i><br><i>(Pseudoperonospora cubensis)</i><br><i>(Pseudomonas lacrymans)</i><br><i>(Erwinia spp.)</i><br><i>(Alternaria cucumerina)</i> | 1.5-2.0 l/ha                           |
| <b>CHILE</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANTRACNOSIS<br>CERCOSPORA<br>MANCHA BACTERIANA<br>TIZON TEMPRANO                | <i>(Colletotrichum capsici)</i><br><i>(Cercospora capsici)</i><br><i>(Xanthomonas vesicatoria)</i><br><i>(Alternaria solani)</i>                                       | 3.0-4.0 l/ha                           |

| CULTIVO                                                                                              | ENFERMEDAD                                                        |                                                                                                                                    | DOSIS                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DURAZNO</b><br>   | TIRO DE MUNICION<br>VERRUCOSIS                                    | <i>(Coryneum beijerinckii)</i><br><i>(Taphrina deformans)</i>                                                                      | 300-500 ml/100 l de agua             |
| <b>FRESA</b><br>     | MANCHA FOLIAR                                                     | <i>(Alternaria spp.)</i>                                                                                                           | 2.5-3.0 l/ha                         |
| <b>FRIJOL</b><br>    | ANTRACNOSIS<br>CENICILLA<br>MANCHA ANGULAR                        | <i>(Colletotrichum spp.)</i><br><i>(Erysiphe polygoni)</i><br><i>(Isariopsis griseola)</i>                                         | 2.5-3.0 l/ha                         |
| <b>JITOMATE</b><br>  | ANTRACNOSIS<br>MANCHA BACTERIANA<br>MANCHA GRIS<br>TIZON TEMPRANO | <i>(Colletotrichum phomoides)</i><br><i>(Xanthomonas vesicatoria)</i><br><i>(Stemphylium solani)</i><br><i>(Alternaria solani)</i> | 2.5-3.0 l/ha                         |
| <b>MANZANO</b><br> | PUDRICION MORENA                                                  | <i>(Monilinia fructicola)</i>                                                                                                      | 300-500 ml/100 l de agua             |
| <b>PAPA</b><br>    | TIZON TARDIO<br>TIZON TEMPRANO                                    | <i>(Phytophthora infestans)</i><br><i>(Alternaria solani)</i>                                                                      | 3.0-4.0 l/ha                         |
| <b>VID</b><br>     | ANTRACNOSIS<br>MILDIU                                             | <i>(Elsinoe ampelina)</i><br><i>(Plasmopara viticola)</i>                                                                          | 600 ml/100 l de agua<br>2.0-3.0 l/ha |

Este producto está exento de tolerancia de residuos, por lo que no existe un límite entre la última aplicación y la cosecha.  
 La dosis deberá ajustarse a la severidad de la infección, edad de las plantas y frondosidad en el caso de frutales