

VALSAGLIF

VALSAGLIF es un herbicida con acción sistémica, no selectivo de amplio espectro para especies de malezas de enraizado profundo, anuales y perennes. Su aplicación es de post-emergencia, cuando las malezas se encuentren creciendo vigorosamente. El ingrediente activo es translocado desde el follaje de las plantas tratadas, a las raíces, rizomas y meristemos apicales. Esta propiedad sistémica permite la destrucción total de las malezas perennes. Este herbicida se inactiva al contacto con el suelo y agua con materia orgánica en suspensión.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

Se absorbe por las hojas y se transloca hasta las raíces y otras partes para el control de malezas rizomatosas.

El producto no tiene actividad en el suelo, por lo que no interfiere con la germinación ni emergencia de cultivos deseables; sin embargo deberá evitar el contacto directo del producto con su follaje.

Para obtener la mayor efectividad es importante que la aplicación sea oportuna y en la dosis recomendada, lo que permitirá un buen control de las malezas presentes.

RECOMENDACIONES DE USO

Método Para Preparar Y Aplicar El Producto: VALSAGLIF puede ser mezclado con el agua directamente en el equipo de aplicación previa calibración, pudiendo ser aspersora terrestre de mochila o montada al tractor. El volumen de agua a emplear dependerá del equipo de aplicación a usar y desarrollo de la maleza, recomendándose de 1.25 a 2.5 L de VALSAGLIF en 100 L de agua para tratamientos localizados. En aplicaciones totales deberá mezclar de 4 a 6 L del producto en 200 a 400 L de agua para una hectárea. Se recomienda el uso de boquillas 8003-8004 para volúmenes convencionales.

Incompatibilidad: VALSAGLIF es compatible con otros herbicidas como Alaclor, Atrazina, Ametrina, Linuron y Metribuzin. Su mezcla debe realizarse únicamente con productos con registro para los cultivos aquí indicados. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad física antes de su aplicación.

Contraindicaciones: Las aplicaciones realizadas antes de la emergencia de las malezas no tienen efecto. Debe evitar aplicar cuando existan vientos mayores de 10 Km/h para evitar la deriva del producto hacia cultivos susceptibles. El equipo de aplicación debe ser solamente utilizado única y exclusivamente para la aplicación de herbicidas de acción similar o en su defecto ser cuidadosamente lavado para evitar contaminación en otros cultivos.

Fitotoxicidad.- VALSAGLIF no es fitotóxico para los cultivos indicados si se utiliza siguiendo las indicaciones de esta etiqueta.

USO AGRICOLA

AgroIQC

VALSAGLIF



GLIFOSATO

Herbicida Agrícola Sistémico/
Solución Acuosa

Garantías de Composición

Ingredientes Activos: Glifosato Sal Isopropilamina de N-(fosfonometil) glicina, con un contenido de N-(fosfonometil) glicina no menor de 74%.

Composición: Glifosato 41% en peso, (Equivalente a 350 g i.a./L).

Presentación: Solución Acuosa.

Tipo de Plaguicida: Herbicida alifático, derivado del ácido N-(fosfonometil) glicina, con acción sistémica, no selectivo de amplio espectro o para especies de malezas de enraizado profundo, anuales y perennes.

Categoría toxicológica: 4

Registro: RSCO-HEDE-0230-006-013-041



Caña de Azúcar

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
Aplicar en huertos de cítricos, durazno, peral, manzano, ciruelo, chabacano y nogal 	Zacate Johnson de rizoma (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	Para tratamiento localizado mezclar 1.25L en 100L de agua. Para mejores resultados, aplique cuando el Zacate Johnson este creciendo vigorosamente y la mayoría de las plantas estén entre la etapa de embuche.
 	Gloria de la mañana o correhuela (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	La dosis corresponde a 1 o 2 aplicaciones de 4 L/ha cada una dependiendo del nivel de infestación y capacidad de rebrote de la maleza. Para tratamiento localizado mezcle de 2 a 2.5 L en 100 L de agua.
Aplicación antes de la siembra o después de la cosecha en: maíz, trigo, cebada, sorgo, avena, alfalfa, alcachofa, acelga, apio, ajo, betabel, brócoli, berenjena, cacahuete, calabaza, cebolla, centeno, coliflor, chícharo, chile, espinaca, frijol, lechuga, melón, mostaza, pepino, papa, pastos, rábano, soya, sandía, zanahoria y jitomate.	Grama (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	Para el tratamiento localizado, mezcle 1.5 L en 100 L de agua. Aplique cuando la Grama este creciendo vigorosamente y hasta antes de la emergencia de las espigas.
	Coquillo (<i>Cyperus spp</i>)	4.0-6.0	Aplíquese cuando el coquillo este creciendo vigorosamente y en cualquier tiempo en que haya presencia de humedad.
	Lechosa (<i>Euphorbia heterophylla</i>)	2.0-4.0	Aplique cuando la maleza este creciendo vigorosamente.