

CUPERQUIMM SUPER®

CUPERQUIMM SUPER es un fungicida cúprico preventivo, que se aplica en aspersión al follaje, útil para prevenir y controlar enfermedades fungosas en los cultivos indicados. El oxiclورو de cobre es la segunda forma de empleo del cobre más extendida después del sulfato.

Este producto no requiere neutralización previa debido a que se aplica como tal, no obstruye boquillas y se usa a menor dosis que el caldo bordelés, presentando mayor compatibilidad con los plaguicidas por su alcalinidad.

Esto explica su amplio uso en variadas aplicaciones y su empleo en formulaciones mixtas de fungicidas orgánicos y compuestos cúpricos, como ocurre en las mezclas con ditiocarbamatos y otras presentes en el mercado.

Su pH con tendencias a la neutralidad es importante debido a que no se presente el riesgo de fitotoxicidad ni corrosividad a los equipos de aplicación.

RECOMENDACIONES DE USO

Método para preparar y aplicar el producto: En una cubeta con agua vierta el producto necesario para la aplicación y agítelo hasta obtener una mezcla uniforme. Agregue la mezcla lentamente y sin dejar de agitar el tanque de aplicación y/o tambor de 200 litros que contenga agua hasta la mitad. Sin dejar de agitar, agregue el agua necesaria para la aplicación cuidando obtener una mezcla uniforme y sin grumos. En cada ocasión que cargue la aspersora, deberá agitar antes la mezcla.

Incompatibilidad: CUPERQUIMM SUPER no debe ser mezclado con productos a base de mercurio.

Fitotoxicidad: CUPERQUIMM SUPER no es fitotóxico a las dosis y cultivos indicados.

Contraindicaciones: CUPERQUIMM SUPER no debe ser aplicado cuando haya amenaza de lluvia o esté lloviendo, ya que puede existir lavado del producto

USO AGRICOLA

AgroIQC

CUPERQUIMM SUPER®



OXICLORURO DE COBRE
Fungicida Cuprico/ Polvo Humectable

Garantías de Composición

Ingrediente Activo: Oxiclورو de Cobre, con un contenido de cobre metálico como elemento no menor de 59.0%

Composición: 85.00% en peso, equivalente a 500 g de ingrediente activo/kg

Presentación: Polvo humectable

Tipo de Plaguicida: Fungicida bactericida cúprico

Categoría Toxicológica: 4

Registro: RSCO-FUNG-0328-014-002-085

Tizón Tardío en Hoja de papa



CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS
AGUACATERO 	MANCHA DE CHAPOPOTE MANCHA FOLIAR PUDRICION DEL FRUTO SARNA O ROÑA	<i>(Phyllachora gratissima)</i> <i>(Cercospora purpurea)</i> <i>(Monilia spp., Diplodia spp.)</i> <i>(Sphaceloma perseae)</i>	300-400 g/100 l de agua
APIO 	MANCHA FOLIAR	<i>(Cercospora apii, Septoria apii)</i>	2-3 Kg/ha
BETABEL 	MANCHA FOLIAR	<i>(Cercospora viticola, Curvularia sp, Septoria sp)</i>	2.0 Kg/ha
CACAHUATE 	MANCHA CAFÉ DE LA HOJA	<i>(Cercospora arachidicola)</i>	2-4 Kg/ha
CACAO 	ANTRACNOSIS MAL DE HILACHAS MAL ROSADO MAZORCA NEGRA PUDRICION MORENA	<i>(Colletotrichum gloeosporioides)</i> <i>(Corticium koleroga)</i> <i>(Corticium salmonicolor)</i> <i>(Phytophthora palmivora)</i> <i>(Diplodia theobromae)</i>	200 g/100 l de agua
CAFETO 	MAL ROSADO MAL DE HILACHAS MANCHA DE HIERRO OJO DE GALLO	<i>(Corticium salmonicolor)</i> <i>(Corticium koleroga)</i> <i>(Cercospora coffeicola)</i> <i>(Mycena citricolor)</i>	200 g/100 l de agua
CITRICOS: Limonero  Naranja  Toronjo 	ANTRACNOSIS MANCHA GRASIENTA MELANOSIS PUDRICION NEGRA DEL FRUTO	<i>(Colletotrichum gloeosporioides)</i> <i>(Mycosphaerella citri)</i> <i>(Diaporthe citri)</i> <i>(Alternaria citri)</i>	200-300 g/100 l de agua

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS
CUCURBITACEAS: Calabaza  Melón  Pepino  Sandía 	ANTRACNOSIS MILDIU TIZON FOLIAR	<i>(Colletotrichum lagenarium)</i> <i>(Pseudoperonospora cubensis)</i> <i>(Alternaria cucumerina)</i>	2-3 Kg/ha
DURAZNO 	MANCHA DEL FRUTO Y HOJA TIRO DE MUNICION VERRUCOSIS VIRUELA O ROYA	<i>(Alternaria sp)</i> <i>(Coryneum beijerinckii)</i> <i>(Taphrina deformans)</i> <i>(Tranzschelia sp)</i>	200-300 g/100 l de agua
FRESA 	PECA DE LA HOJA	<i>(Mycosphaerella fragariae)</i>	2-3 Kg/ha
GUAYABO 	ANTRACNOSIS CLAVO	<i>(Colletotrichum gloeosporioides)</i> <i>(Pestalotia sp)</i>	300 g/100 l de agua
MANGO 	ANTRACNOSIS MAL DE HILACHAS MANCHA CAFÉ ROÑA DEL FRUTO	<i>(Colletotrichum gloeosporioides)</i> <i>(Corticium koleroga)</i> <i>(Pestalotia mangiferae)</i> <i>(Elsinoe mangiferae)</i>	300-400 g/100 l de agua
MANZANO 	PUDRICION AMARGA ROÑA O SARNA	<i>(Glomerella cingulata)</i> <i>(Venturia inaequalis)</i>	200-300 g/100 l de agua

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS
ORNAMENTALES 	ANTRACNOSIS MANCHA FOLIAR ROYA TIZON FOLIAR	<i>(Colletotrichum spp.)</i> <i>(Septoria spp.)</i> <i>(Puccinia spp.)</i> <i>(Alternaria spp.)</i>	200-300 g/100 l de agua
PAPAYO 	ANTRACNOSIS	<i>(Colletotrichum gloeosporioides)</i>	200 g/100 l de agua
PERAL 	PUDRICION AMARGA ROÑA O SARNA	<i>(Glomerella cingulata)</i> <i>(Venturia inaequalis)</i>	200-300 g/100 l de agua
PLATANO 	CHAMUSCO AMARILLO	<i>(Mycosphaerella musicola)</i>	200-300 g/100 l de agua
TABACO 	MOHO AZUL OJO DE RANA TIZON TARDIO TIZON TEMPRANO	<i>(Peronospora tabacina)</i> <i>(Cercospora nicotianae)</i> <i>(Phytophthora infestans)</i> <i>(Alternaria solani)</i>	2-4 Kg/ha
VID 	MILDIU	<i>(Plasmopara viticola)</i>	200-300 g/100 l de agua

Este producto está exento de tolerancia de residuos, por lo que no existe un límite entre la última aplicación y la cosecha.



Glomerella cingulata en Manzana



Corticium salmonicolor en Cacao



Cercospora nicotianae en Hoja de Tabaco