

HIDROXIFLUABLE®

HIDROXIFLUABLE es un fungicida cúprico preventivo, cuya presentación en suspensión acuosa permite una fácil aplicación; debido a su tamaño de partícula, se obtiene una mejor actividad biológica y mayor persistencia al lavado por lluvia. Se aplica en aspersión al follaje, útil para prevenir enfermedades fúngicas que atacan a los cultivos indicados.

RECOMENDACIONES DE USO

Método para preparar y aplicar el producto:

Antes de usar el producto, agite perfectamente el envase con su contenido para asegurar una mezcla uniforme. HIDROXIFLUABLE se mezcla directamente con suficiente cantidad de agua para lograr un cubrimiento uniforme de las superficies tratadas. Llene el equipo de aplicación hasta la mitad de su capacidad, vierta la cantidad de HIDROXIFLUABLE que vaya a aplicar, posteriormente complete el agua y agite vigorosamente hasta obtener una mezcla homogénea.

Incompatibilidad: HIDROXIFLUABLE no debe ser mezclado con productos de fuerte reacción alcalina.

Fitotoxicidad: HIDROXIFLUABLE a las dosis recomendadas no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados.

Contraindicaciones: HIDROXIFLUABLE no debe ser aplicado cuando haya amenaza de lluvia o este lloviendo, ya que puede existir lavado del producto.

USO AGRICOLA

AgroIQC

HIDROXIFLUABLE®



HIDRÓXIDO CÚPRICO

Fungicida Cúprico/ Suspensión Acuosa

Garantías de Composición

Ingrediente Activo: Hidróxido Cúprico ($\text{Cu}(\text{OH})_2$)
con un contenido de cobre metálico como
elemento no menor de 65.0%

Composición: 23.46% en peso, equivalente 169 g de
ingrediente activo/litro

Presentación: Suspensión acuosa

Tipo de plaguicida: fungicida cúprico

Categoría Toxicológica: 4

Registro: . RSCO-FUNG-0319-011-008-023



Mancha Negra en Rosal



Antracnosis en Mango



Roya en Cafeto

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS
AGUACATERO 	ANTRACNOSIS ROÑA	<i>(Colletotrichum gloeosporioides)</i> <i>(Sphaceloma perseae)</i>	300 a 400 ml/100 l de agua
APIO 	MANCHA FOLIAR	<i>(Cercospora apii, Septoria apii)</i>	2.0 a 3.0 l/ha
CACAHUATE 	PECA DE LA HOJA	<i>(Cercospora personata)</i>	1.5-2.5 l/ha
CACAO 	PUDRICION NEGRA	<i>(Phytophthora palmivora)</i>	2.0 a 2.5 l/ha
CAFETO 	MAL ROSADO ROYA	<i>(Corticium salmonicolor)</i> <i>(Hemileia vastatrix)</i>	2.0 a 2.5 l/ha
CHILE 	ANTRACNOSIS OJO DE RANA	<i>(Colletotrichum capsici)</i> <i>(Cercospora spp.)</i>	2.0 a 2.5 l/ha
CITRICOS: Limónero  Naranja  Toronjo 	MANCHA GRASIENTA MELANOSIS ROÑA	<i>(Mycosphaerella citri)</i> <i>(Diaporthe citri)</i> <i>(Elsinoe fawcetti)</i>	200 a 300 ml/100 l de agua (4 l/ha máx)

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS
DURAZNO 	TIRO DE MUNICION VERRUCOSIS	<i>(Coryneum beijerinckii)</i> <i>(Taphrina deformans)</i>	300 a 400 ml/100 l de agua
FRIJOL 	ANTRACNOSIS	<i>(Colletotrichum lindemuthianum)</i>	1.5 a 2.5 l/ha
JITOMATE 	MANCHA DE LA HOJA TIZON TARDIO TIZON TEMPRANO	<i>(Glomerella cingulata)</i> <i>(Phytophthora infestans)</i> <i>(Alternaria solani)</i>	2.5 a 3.0 l/ha
MANGO 	ANTRACNOSIS	<i>(Colletotrichum gloeosporioides)</i>	300 a 400 ml/100 l de agua
PAPA 	TIZON TARDIO TIZON TEMPRANO	<i>(Phytophthora infestans)</i> <i>(Alternaria solani)</i>	1.5-2.0 l/ha 2.5-3.0 l/ha
PLATANO 	CHAMUSCO AMARILLO	<i>(Mycosphaerella musicola)</i>	2.0 a 2.5 l/20 l de agua
ROSAL 	MANCHA NEGRA	<i>(Diplocarpon rosae)</i>	1.0 a 2.0 l/ha
TABACO 	MANCHA CAFE OJO DE RANA	<i>(Alternaria longipes)</i> <i>(Cercospora nicotianae)</i>	2.0 a 3.0 l/ha
ZANAHORIA 	MILDIU VELLOSO	<i>(Pseudoperonospora spp.)</i>	2.0 a 2.5 l/ha