

INTER-A-CH-C

Modo y mecanismo de acción: Los compuestos del producto constituyen una señal inequívoca para el insecto que le dificulta encontrar su fuente de alimento; provoca repelencia y excitación del sistema nervioso que les dificulta el vuelo y la oviposición; el efecto irritante induce a los insectos a salir de sus refugios, facilitando su control. Su olor causa desorientación durante la etapa de reproducción de los insectos y obstruye la acción de las feromonas sexuales, causando desorientación durante la etapa de reproducción, disminuyendo de esta forma las poblaciones insectiles.

RECOMENDACIONES DE USO

Método para preparar el producto: agite el producto antes de usarlo. Para abrir el envase del producto, gire la tapa en sentido inverso a la dirección de las manecillas del reloj. Acondicione el pH del agua en el rango de 6.5 a 7.5. Utilice recipientes plásticos para preparar el producto. Vierta la cantidad debidamente medida del producto directamente con la suficiente cantidad de agua siempre en primer orden de adición a los otros insumos que contendrá la mezcla. Para obtener una mayor calidad en la aplicación del producto, es recomendable adicionar a la mezcla un surfactante-penetrante a base de órgano silicona.

Método para aplicar el producto: Realice las aplicaciones foliares de forma preventiva o al observar las primeras infestaciones; aplíquelo durante todo el ciclo de cultivo, amplíe el intervalo durante la floración y polinización; es conveniente aplicar una franja alrededor del cultivo. No aplicar en plantas estresadas por riegos inadecuados y temperaturas extremas.

Procure que el tamaño de gota y presión de aspersión permitan la cobertura de sitios donde se localizan las plagas. Aplique la dosis mayor en infestaciones altas y cuando el follaje sea denso.

Compatibilidad: Compatible con sustancias oxidantes, sustancias reductoras, incompatible con sustancias alcalinas. Para las mezclas que se realicen con otros productos se recomienda utilizar los que cuenten con registro autorizado y vigente para los cultivos indicados en su etiqueta; sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación. No lo mezcle con productos cuya compatibilidad no está completamente comprobada.

Contraindicaciones: Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación. Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté lloviendo y cuando el viento favorezca la deriva.

USO AGRICOLA

AgroIQC

INTER-A-CH-C



Extracto de ajo + Extracto de chile picante
+ Extracto de canela
Insecticida / Líquido Soluble

Garantías de Composición

Ingrediente activo: Extracto de ajo (*Allium sativum*),
chile picante (*Capsicum frutescens*) y
canela (*Cinnamomum zeylanicum*)

Composición: Extracto de ajo 25.00%,
extracto de chile picante 25% y
extracto de canela 10%

Presentación: Líquido soluble

Tipo de plaguicida: Insecticida (botánico)

Categoría: 5

Registro: RSCO-INAC-1802-0243-052-60

Adultos de mosca blanca



CULTIVO	PLAGA	DOSIS	LRM(ppm)	OBSERVACIONES
Berenjena, chile, chile habanero, jitomate, pimiento, papa, tomate de cascara (SL) 	Adultos de mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	1.5 a 2.0	Exento	Realizar 3 aplicaciones a intervalos de 7 días. Para asegurar un adecuado control, es necesario adicionar a la mezcla un coadyuvante no iónico.
Calabacita, calabaza, chayote, melón, pepino, sandia (SL) 	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	1.5- 2.0	Exento	Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días; volumen de aplicación 550-650 L de agua/ha.
Arándano, frambuesa, fresa, grosella, zarzamora (SL) 	Mosca del vinagre de las alas manchadas (<i>Drosophila suzuki</i>)	3.0 L/200L de agua	Exento	

Intervalo entre aplicaciones: Cada 7 días.

Tiempo de reentrada: No tiene restricciones de tiempo para entrar a las superficies tratadas, solo espere a que seque la aspersión realizada.

Intervalo de seguridad: No es necesario un intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha.