

INTERMICIN 100

Los antibióticos son compuestos con una alta selectividad bioquímica los cuales pueden ser introducidos en forma selectiva a la planta. Estos compuestos ejercen una función importante en el control de enfermedades bacterianas, con acción fungicida probablemente interfiriendo en la división celular. INTERMICIN 100 es un producto selectivamente tóxico para bacterias y hongos, cuyas propiedades sistémicas permite que sea absorbido y distribuido a todas las partes de la planta, protegiéndola del ataque interno y externo de las enfermedades indicadas.

RECOMENDACIONES DE USO

Método para preparar y aplicar el producto:

En una cubeta con agua mezcle la cantidad necesaria de INTERMICIN 100 para la aplicación y agite hasta obtener una lechada uniforme. Sin dejar de agitar, agregue lentamente esta suspensión al tanque de aplicación o tambo de 200 l que contenga agua hasta la mitad de su capacidad. Agregue la cantidad faltante de agua y mantenga la agitación hasta obtener una mezcla uniforme y sin grumos. En cada ocasión que cargue la aspersora deberá agitar la mezcla del tambo. INTERMICIN 100 puede ser aplicado con cualquier equipo aspersor siempre y cuando facilite la cobertura uniforme de las superficies tratadas.

Incompatibilidad: INTERMICIN 100 no debe ser mezclado con productos de fuerte reacción alcalina.

Fitotoxicidad: INTERMICIN 100 no es fitotóxico a los cultivos indicados en la dosis recomendada.

Contraindicaciones: Las aplicaciones deberán realizarse antes de la formación de los botones florales y después de la cosecha. Contiene antibióticos no estériles, por lo que deberá evitar su uso en medicina veterinaria, humana o cualquier otro uso diferente al agrícola.

USO AGRICOLA

AgroIQC

INTERMICIN 100®



OXITETRACICLINA + ESTREPTOMICINA
Bactericida/ Polvo Soluble

Garantías de Composición

Ingrediente Activo: Estreptomicina (Sulfato de estreptomicina, con un contenido de estreptomicina no menor del 80%).

Oxitetraciclina (Clorhidrato de oxitetraciclina, con un contenido de oxitetraciclina no menor del 75%).

Composición: 18.75% en peso de estreptomicina, equivalente a 150 g de ingrediente activo/kilogramo. 2.00% en peso de oxitetraciclina, equivalente a 15 g de ingrediente activo/kilogramo.

Presentación: Polvo soluble.

Tipo de Plaguicida: Bactericida fungicida sistémico.

Categoría Toxicológica: 4

Registro: RSCO-MEYC-1305-001-003-021

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
PERAL (30) 	TIZON FUEGO (<i>Erwinia Amylorova</i>)	600 g/ 100 l de agua

() Días entre la última aplicación y la cosecha.