

INTERMICIN 500

Los antibióticos son compuestos con una alta selectividad bioquímica los cuales pueden ser introducidos en forma selectiva a la planta. Estos compuestos ejercen una función importante en el control de enfermedades bacterianas, con acción fungicida probablemente interfiriendo en la división celular. INTERMICIN 500 es una mezcla de dos antibióticos (estreptomicina, oxitetraciclina) más sulfato tribásico de cobre, con propiedades sistémicas y de contacto, formulado como polvo humectable para la prevención y control de la enfermedad bacteriana conocida como Tizón de fuego.

RECOMENDACIONES DE USO

Método para preparar y aplicar el producto:

En una cubeta con agua mezcle la cantidad necesaria de INTERMICIN 500 para la aplicación y agite hasta obtener una lechada uniforme. Sin dejar de agitar, agregue lentamente esta suspensión al tanque de aplicación o tambo de 200 l que contenga agua hasta la mitad de su capacidad. Agregue la cantidad faltante de agua y mantenga la agitación hasta obtener una mezcla uniforme y sin grumos. En cada ocasión que cargue la aspersora deberá agitar la mezcla del tambo. INTERMICIN 500 puede ser aplicado con cualquier equipo aspersor siempre y cuando facilite la cobertura uniforme de las superficies tratadas.

Incompatibilidad: INTERMICIN 500 no debe ser mezclado con productos de fuerte reacción alcalina como caldo bordelés.

Fitotoxicidad: INTERMICIN 500 no es fitotóxico al cultivo indicado en la dosis recomendada.

Contraindicaciones: Contiene antibióticos no estériles, por lo que deberá evitar su uso en medicina veterinaria, humana o cualquier otro uso diferente al agrícola.

USO AGRICOLA

AgroIQC

INTERMICIN 500[®]



OXI. + EST. + SULFATO TRIBÁSICO DE COBRE
Bactericida + Fungicida Cúprico/ Polvo
Soluble Humectable

Garantías de Composición

Ingrediente Activo: Estreptomicina (Sulfato de estreptomicina, con un contenido de estreptomicina no menor del 80%). Oxitetraciclina (Clorhidrato de oxitetraciclina, con un contenido de oxitetraciclina no menor del 75%). Sulfato tribásico de cobre, con un contenido de cobre no menor del 54%.

Composición: 0.235% en peso de oxitetraciclina, equivalente a 1.76 g de ingrediente activo/kilogramo. 2.20% en peso de estreptomicina, equivalente a 17.6 g de ingrediente activo/kilogramo. 71.865% en peso de sulfato tribásico de cobre, equivalente a 424 g de ingrediente activo/kilogramo.

Presentación: Polvo humectable.

Tipo de Plaguicida: Bactericida fungicida sistémico.

Categoría Toxicológica: 4

Registro: RSCO-MEZC-1306-302-002-074.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
PERAL (30) 	TIZON FUEGO (<i>Erwinia Amylorova</i>)	600 g/ 100 l de agua

() Días entre la última aplicación y la cosecha.