

INTERMICINA AGRÍCOLA

Los antibióticos son compuestos con una alta selectividad bioquímica los cuales pueden ser introducidos en forma selectiva a la planta. Estos compuestos ejercen una función importante en el control de enfermedades bacterianas, con acción fungicida probablemente interfiriendo en la división celular. INTERMICINA AGRÍCOLA es un bactericida con propiedades sistémicas que contiene el hidrato de oxitetraciclina (antibiótico), formulado como polvo humectable para la prevención y control de la enfermedad bacteriana conocida como Tizón de fuego.

RECOMENDACIONES DE USO

Método para preparar y aplicar el producto.- En una cubeta con agua mezcle la cantidad necesaria de INTERMICINA AGRÍCOLA para la aplicación y agite hasta obtener una lechada uniforme. Sin dejar de agitar, agregue lentamente esta suspensión al tanque de aplicación o tambo de 200 l que contenga agua hasta la mitad de su capacidad. Agregue la cantidad faltante de agua y mantenga la agitación hasta obtener una mezcla uniforme y sin grumos. En cada ocasión que cargue la aspersora deberá agitar la mezcla del tambo. INTERMICINA AGRÍCOLA puede ser aplicado con cualquier equipo aspersor siempre y cuando facilite la cobertura uniforme de las superficies tratadas.

Incompatibilidad: INTERMICINA AGRÍCOLA no debe ser mezclado con productos de fuerte reacción alcalina como caldo bordelés.

Fitotoxicidad: INTERMICINA AGRÍCOLA no es fitotóxico al cultivo indicado en la dosis recomendada

Contraindicaciones: INTERMICINA AGRÍCOLA contiene antibiótico no estéril, por lo que deberá evitar su uso en medicina veterinaria, humana o cualquier otro uso diferente al agrícola.

USO AGRÍCOLA

AgroIQC

INTERMICINA AGRÍCOLA®



OXITETRACICLINA
Bactericida/ Polvo Soluble

Garantías de Composición

Ingrediente Activo: Oxitetraciclina
(Clorhidrato de oxitetraciclina).

Composición: 5.0% en peso, equivalente
a 50 g de i.a./Kg.

Presentación: Polvo soluble.

Tipo de Plaguicida: Bactericida sistémico.

Categoría Toxicológica: 4

Registro: RSCO-FUNG-0330-310-003-005

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
PERAL (30) 	TIZON FUEGO (<i>Erwinia Amylorova</i>)	400 g/ 100 l de agua

() Días entre la última aplicación y la cosecha.