

INTERPIRET

Modo y mecanismo de acción: Sus componentes traspasan la cutícula de los insectos afectando el sistema nervioso. Tiene acción excitatoria intensa, provoca hipersensibilidad a los estímulos externos, ocasionando convulsiones, tetanización de músculos y muerte del insecto. Obstruye y altera el impulso nervioso en las neuronas mediante la interferencia del movimiento de los iones potasio (K) y sodio (Na), por lo que presenta efecto irritante o derribe que hace que el insecto apenas entre en contacto con las superficies tratadas deje de alimentarse y se paralice con la pérdida de la capacidad de vuelo.

RECOMENDACIONES DE USO

Método para preparar el producto:

Agite el producto antes de usarlo. Acondicione el agua a un pH de 6 a 6.5 para una mejor acción del producto. Utilice recipientes plásticos o de otro material no ionizante para realizar la mezcla.

Vierta la cantidad necesaria del producto directamente con la suficiente cantidad de agua siempre en primer orden de adición a los otros insumos que contendrá la mezcla.

Es recomendable mantener una agitación constante al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea.

La cantidad de agua a utilizar dependerá de la calibración en función del cultivo a asperjar, se recomienda utilizar 200 L/ha. Para obtener una mayor calidad en la aplicación del producto, es recomendable adicionar a la mezcla un surfactante-penetrante a base de órgano silicona.

Método para aplicar el producto: Se recomienda realizar las aplicaciones al observar las primeras oviposaduras o infestaciones de la plaga. Procure que el producto tenga contacto con los insectos, que el tamaño de gota y presión de aspersión permitan la cobertura de sitios donde se localiza la plaga.

Aplique la dosis mayor en infestaciones altas y cuando el follaje sea denso. Puede aplicarse durante la floración y fructificación. Se recomienda realizar las aplicaciones en las últimas horas de luz de la tarde ya que es un producto fotodegradable y de poca estabilidad ante su exposición a los rayos solares. Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

USO AGRICOLA

AgroIQC

INTERPIRET



Extracto de Tagetes (*Tagetes spp.*)
Insecticida Botánico/Concentrado Emulsionable

Garantías de Composición

Ingrediente activo: Extracto de Tagetes (*Tagetes spp.*)

Composición: 90% equivalente a 831.60 g de i.a/L


Presentación: Concentrado emulsionable

Tipo de plaguicida: Insecticida (botánico)

Categoría: 5

Registro: RSCO-INAC-0350T-X0006-009-94.5

Mosca del vinagre de las alas manchadas



Compatibilidad: Para las mezclas que se realicen con otros productos se recomienda utilizar los que cuenten con registro autorizado y vigente para los cultivos indicados en esta etiqueta; sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación. Compatible con oxitetraciclina, aminoácidos (Glicina, Valina, Prolina, Hidroxiprolina, Alanina, ac. Aspártico, Arginina, ac. Glutámico, Lisina, Leucina, Isoleucina, Fenilalanina, Metionina, Serina, Asparagina, Treonina, Cistina y Cisteina, Tirosina, Histidina), extracto de Gobernadora, Argemonina, Berberina, Ricinina, α -Terthienil.

Contraindicaciones: No use el producto de forma diferente a lo recomendado en su etiqueta. Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación. Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté o amenace lluvia y cuando el viento favorezca la deriva.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/200 L de agua)	OBSERVACIONES
Arándano, frambuesa, fresa, grosella, zarzamora (SL) 	Mosca del vinagre de las alas manchadas (<i>Drosophila suzuki</i>)	2.0- 3.0	Realizar 3 aplicaciones dirigidas al follaje a intervalo de 7 días

Intervalo entre aplicaciones: 7 días.

Tiempo de reentrada: No tiene restricciones de tiempo para entrar a las superficies tratadas

Intervalo de seguridad: No es necesario un intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha.